



Giardiase Canina



MSc MV Mauricio Aquino

Especialista em Docência e

Mestre em Ciências da Saúde

Proprietário da KennelVeterinaria.com

A giardiase é uma doença causada pelo protozoário denominado **Giardia lamblia**.

É uma doença que acomete o trato intestinal de animais domésticos, silvestres, inclusive o próprio homem, sendo considerada uma zoonose pela organização mundial de saúde – OMS desde 1979.

Os animais são infectados pela ingestão de cistos de **G. lamblia** eliminados pelas fezes de outros animais in-

fectados, que contaminam o ambiente, a água e os alimentos.

Estes cistos são muito resistentes ao ambiente e a maioria dos desinfetantes conhecidos.

A infecção por **G. lamblia** é comum nas cidades e apresenta altos índices de prevalência em todo mundo, podendo causar sinais clínicos de moderado a severo em animais imunossuprimidos, jovens e desnutridos ou, apresentar-se de forma assintomática em animais adultos, que funcionam como portadores assintomáticos, contribuindo para perpetuação da infecção no ambiente.

Atualmente temos encontrado uma grande quantidade de cães com este parasito em Maceió, adquiridos ao nascer ou em pontos de grande visitação de animais, como as praças e os canteiros públicos. Por ser um protozoário resistente, além do tratamento parenteral a base de diversos quimioterápicos, o uso da vacina específica reforça o sistema imunológico, constituindo-se num importante adjuvante do tratamento e/ou profilaxia.

“A giardiase promove atrofia das vilosidades e das

microvilosidades intestinais resultando em má digestão e absorção de alimentos. [...] Os animais vão apresentar diferentes manifestações clínicas, indo de casos assintomáticos e sintomáticos que podem ser persistente, intermitente ou autolimitante. [...] Em cães, os sintomas normalmente observados são: fezes pastosas à aquosas com odor fétido, em grandes volumes, com esteatorréia (presença de gordura nas fezes) e flatulência, geralmente sem muco ou sangue; [...] dor abdominal, desidratação e perda de peso também são observados”. (TECSA, 2019)

O diagnóstico é relativamente simples e a técnica mais utilizada na Kennel Veterinária é o parasitológico denominado: Método de FAUST.

Nós recomendamos que os proprietários de cães façam exames parasitológicos periódicos que são mais importantes que as vermifugações aleatórias, muitas vezes por indicações de balconistas e quase sempre desnecessárias.

TECSA. Giardiase em cães. Jornada do Conhecimento. Disponível em: <<http://www.tecsa.com.br/assets/pdfs/Giardiase%20em%20caes%282%29.pdf>> Acesso em: 28/03/2019.



Giardia lamblia